

راهنمای نمونه گیری خلط

لطفاً قبل از انجام نمونه گیری موارد زیر را مطالعه فرمائید:

نمونه صبحگاهی بهتر است و ترجیحاً ناشتا باشید. لازم است قبل از گرفتن خلط، دهان بیمار چند بار با آب معمولی شسته شود. نفس عمیقی از راه بینی کشیده و برای لحظه ای نفس خود را در سینه حبس نمایید و سپس با سرفه عمیق خلط خود را در ظرف مخصوص تخلیه نمایید.

در صورتیکه امکان جمع اوری نمونه خلط با سرفه کردن فراهم نشد میتوانید از غرغره آب استفاده کنید. سعی کنید نمونه، آب دهان نباشد، آب دهان شفاف و آبکی است ولی خلط چسبندگی دارد. در صورت نمونه گیری در منزل، صبح پس از بیدار شدن از خواب و قبل از مصرف هر گونه غذا، با سرفه ای عمیق خلط خود را خارج و در ظرف مخصوص تخلیه نمائید و در کوتاهترین زمان ممکن به بخش نمونه گیری تحویل دهید.

در حین حمل ظرف از منزل، نمونه خلط از گرما و نور مستقیم آفتاب دور نگه داشته شود. اگر در حال مصرف دارو خاصی هستید آزمایشگاه را مطلع سازید. حداقل حجم نمونه 2 میلی لیتر باشد (3-0 میلی لیتر بهتر است)

نگهداری و حمل و نقل نمونه: نمونه در ظرف درب بسته (پیچ دار) تهیه شده و در دمای 2-8 درجه نگهداری شده و همان روز به آزمایشگاه منتقل شود. هنگام حمل نمونه دور از گرما و نور مستقیم آفتاب باشد. در تمام مراحل نمونه گیری از دستکش یکبار مصرف استفاده شود.

توجه شما به نکات یاد شده باعث افزایش صحت و دقت آزمایش خواهد شد.

آدرس: انتهای غربی بزرگراه همت - ابتدای بزرگراه خرازی - آزمایشگاه پاتوبیولوژی بیمارستان

تریتا - تلفن : ۴۷۲۴۱۰۰۰ - داخلی ۳۱۲-۱۴۴