

راهنمای نمونه گیری مدفوع جهت انگل و خون مخفی (OB)

لطفاً قبل از انجام نمونه گیری موارد زیر را مطالعه فرمائید:

برای انجام این آزمایش باید نکات زیر را رعایت نمایید:

- خانم هایی که عادت ماهیانه هستند تا سه روز پس از پایان دوره فوق از انجام این آزمایش خودداری نمایند .
- چنانچه بیمار به بواسیر یا شقاق مقعد مبتلا بوده و خونریزی واضحی از این ضایعات مشاهده می گردد به آزمایشگاه اطلاع داده شود .
- چنانچه بیمار به علل مختلف دچار خونریزی از لثه ها یا مخاط دهان است بلع خون از این ناحیه سبب مثبت شدن کاذب آزمایش می گردد .
- دو تا سه روز پیش از آزمایش و در طی دوره جمع آوری ، نمونه ، از خوردن این غذاها خودداری شود: گوشت قرمز (بهتر است گوشت مرغ و ماهی نیز مصرف نگردد) ، سبزیجات خام به خصوص شلغم ، ترب و تربچه ، قارچ و کلم بروکلی و گل کلم و پرتقال ، موز ، انگور ، طالبی یا گرمک ، خربزه ، ترب کوهی .
- حداقل از هفت روز قبل از انجام آزمایش از مصرف داروهای زیر اجتناب گردد در غیر این صورت به آزمایشگاه اطلاع داده شود:

سالیسیلات ها مانند آسپرین ، سایر داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی مانند ایبوپروفن ، ایندومتاسین ، دیکلوفناک سدیم ، داروهای استروئیدی ، کلشی سین ، ویتامین C ، آنتی اسیدها ، ترکیبات آهن دار ، ترکیبات ید دار ، دیووتیک های نیازیدی ، روزپین .

آدرس: انتهای غربی بزرگراه همت - ابتدای بزرگراه خرازی - آزمایشگاه پاتوبیولوژی بیمارستان

تریتا - تلفن : ۴۷۲۴۱۰۰۰ - داخلی ۳۱۲-۱۴۴

- لازم به ذکر است که با توجه به تنوع داروهای مصرفی و امکان تداخل آنها با نتایج آزمایش بهتر است مصرف هرگونه دارو را قبل از انجام آزمایش به اطلاع پزشک معالج برسانید .

شرایط نگهداری نمونه و نحوه انتقال :

- نمونه باید سریعاً به آزمایشگاه تحویل داده شود در غیر این صورت تا زمان رسیدن به آزمایشگاه در دمای معادل یخچال نگهداری شود و از قراردادن نمونه ها در گرما یا در مجاورت نور خورشید خودداری شود .
- تأخیر در آزمایش می تواند تاثیر منفی بر نتایج این آزمایش داده باشد و نباید با ادرار با سایر مواد آلوده شود.

توجه شما به نکات یادشده باعث افزایش صحت ودقت آزمایش خواهدشد.