

راهنمای نمونه گیری جهت آزمایش پرولاکتین

لطفاً قبل از انجام نمونه گیری موارد زیر را مطالعه فرمایید:

۱. ترجیحاً ۱۲ ساعت ناشتا باشید و نمونه گیری صبح انجام شود.
۲. در زمان مراجعه به آزمایشگاه، حداقل ۲ ساعت از بیدار شدن شما گذشته باشد.
۳. حداقل ۱۲ ساعت قبل از انجام آزمایش، از تماس جنسی اجتناب فرمایید.
۴. حداقل ۱۲ ساعت قبل از انجام آزمایش، از هر گونه معاینه، ماساژ، شیر دادن و ... اجتناب فرمایید.
- ۵.
۶. حداقل ۱۲ ساعت قبل از انجام آزمایش، از ورزش کردن و فعالیت شدید بدنی خودداری نمایید.
۷. ترجیحاً از شب قبل از آزمایش، لباس راحت و گشاد بپوشید.
۸. در زمان نمونه گیری استرس نداشته باشید و قبل از نمونه گیری به مدت ۳۰ دقیقه آرام در جایی بنشینید.
۹. از مصرف برخی داروها مانند داروهای استروژن، ضد افسردگی، خواب آور، آفتمامین، داروهای فشار خون (متیل دوبا و ...)، داروهای رفلکس معده (سایمتیدین و ...) خودداری نمایید (طبق نظر پزشک معالج).
۱۰. در صورت مصرف داروی خاصی یا سابقه بیماری، حتماً در هنگام پذیرش عنوان نمایید.

توجه شما به نکات یادشده باعث افزایش صحت ودقت آزمایش خواهد شد.

آدرس: انتهای غربی بزرگراه همت - ابتدای بزرگراه خرازی - آزمایشگاه پاتوبیولوژی بیمارستان

تریتا - تلفن : ۴۷۲۴۱۰۰۰ - داخلی ۳۱۲-۱۴۴