

آمادگی ترانزیت تایم کولون

ترانزیت تایم کولون (C.T.T) چیست و چگونه انجام میشود ؟
در موارد یبوست مزمن که بیش از سه ماه طول میکشد و بیماری زمینه ای وجود ندارد ، اجرای درمان صحیح ، وابسته به وضعیت زمان ترانزیت کولون CTT میباشد به طوری که اگر CTT طبیعی نباشد یا کندی حرکات کولون مشاهده شود یا اختلال در تخلیه مدفوع از رکتوم باشد درمانهای متفاوت و خاص خود را دارد.

آمادگی های لازم جهت انجام تصویر برداری:
بیمار به مدت 2 هفته باید تمامی داروهای ملین را قطع کند و در یک وعده غذایی خود همراه با غذا 30 گرم فیبر استفاده کند. مثل یک بشقاب سالاد. بعد از پایان دو هفته ، بیمار به مدت سه روز متوالی در یک ساعت مشخص ترجیحا بعد از صبحانه تعداد مشخصی از کپسولهایی که کارشناس بخش در اختیار بیمار قرار میدهد، باید بخورد. سپس بیمار در روز **چهارم ، هفتم و دهم** جهت تهیه گرافی از شکم، در همان ساعت مشخص به بخش مراجعه میکند.
از روز اول یعنی شروع مصرف کپسول ها تا زمانی که آخرین عکس گرفته میشود ، بیمار همچنان نباید از هیچ گونه ماده ملینی استفاده کند.
در خصوص خانم ها رژیم غذایی 2 هفته ای باید بعد از پایان دوره پرپودشان شروع شود.

بیمارستان تربیتا

تهران، بزرگراه همت ، بزرگراه شهید خرازی ، بعد از تقاطع آزادگان ، خروجی بیمارستان تربیتا

0214۷۲۴۱۰۰۰