

آمادگی هیستروسالپنگوگرافی

اقدامات پیش از انجام هیستروسالپنگوگرافی :

- ✓ از شروع خونریزی پریود تا انجام گرافی نزدیکی نداشته باشید .
- ✓ هر ۱۲ ساعت کپسول داکسی سایکلین استفاده کنید از ۳ روز قبل انجام گرافی.
- ✓ در روز انجام گرافی همراه خود ۲ عدد استامینوفن و ۲ عدد هیوسین داشته باشید .
- ✓ بیمار می بایست روز انجام گرافی عفونت نداشته باشد .

عوارض عکس رنگی رحم:

از مهمترین عوارض هیستروسالپنگوگرافی می توان به درد و انقباض عضلانی اشاره کرد. خونریزی واژینال خفیف، احساس گیجی و درد های شکمی از دیگر عوارض عکس رنگی رحم می باشند. در موارد بسیار نادر، کاهش و از دست رفتن سطح هوشیاری و گرفتگی عضلانی نیز در بیماران دیده می شود.

خطرات هیستروسالپنگوگرافی :

از علائم خطر هیستروسالپنگوگرافی می توان به واکنش های آلرژیک، عفونت لوله های رحمی و یا آندومتر اشاره کرد.

علائم عفونت پس از عکس رنگی رحم :

در صورتی که دچار عفونت شدید حتما به پزشک مراجعه کنید. علائم ابتلا به عفونت عبارتند از :

- تب
- درد شدید لگنی
- ترشحات واژینال
- تهوع