

آمادگی بیوپسی پروستات

1. قرص مترونیدازول دو روز قبل از بیوپسی هر هشت ساعت 2 عدد مصرف شود.
2. قرص افلوکساسین از دو روز قبل از بیوپسی هر هشت ساعت 1 عدد مصرف شود.
{این قرص ها با 2ساعت اختلاف و شکم پر میل شود}
3. آمپول آمیکاسین، یکی شب قبل بیوپسی و دیگری نیم ساعت قبل از انجام کار تزریق شود.
4. شیاف را ساعت هشت شب قبل بیوپسی استفاده نمایند.
5. احتیاج به ناشتایی ندارد.
6. حضور یک نفر همراه الزامی است.
7. آزمایش INR و سایر مدارک قلبی (شامل سونوگرافی، آزمایش، MRI و سی دی) همراه داشته باشند.
8. با توجه به تخصصی بودن این سرویس لطفا حداقل 5 ساعت برای انجام کار خود در نظر بگیرید.
9. بیماران قلبی باید مصرف قرصهای ضد انعقاد خون را 5 روز قبل از انجام بیوپسی با مشاوره پزشک معالج خود قطع نمایند.
10. شب قبل بیوپسی شام سوپ صاف شده میل شود.
11. صبح روز بیوپسی صبحانه مفصل میل شود..
- 12- اب معدنی کوچک+ابمیوه شیرین روز انجام بیوپسی تهیه گردد.

داروهای مصرفی قبل از انجام بیوپسی

Title	N	طریقه مصرف
Metronidazole 250mg Tab	60	هر 8 ساعت 2 عدد همزمان میل شود.
Ofluxacin 300mg Tab	30	هر 8 ساعت 1 عدد میل شود.
Amikacin 500mg Amp	2	یکی شب قبل انجام و دیگری هنگام انجام.
Rectal suppository	1	شب بیوپسی

عنوان	تعداد	عنوان	تعداد
سوزن بیوپسی 20cm*18g	1	دروشیت	2
سوزن شیا 20cm*20g	1	رکتال تیوب طوسی 35	1
لیدوکائین 5cc-2% vial	2	انژیوتک صورتی	1
لیدوکائین 2% gel tube	2	ست سرم	1
سرنگ 10cc	1	سرم levofloxacin 5mg/ml100	1
پوشک بزرگسالان	1	سرنگ گاواژ	1
زل بتادین واژینال	1		

اطلاعات ضروری بعد از انجام بیوپسی پروستات

- داروهای آنتی بیوتیک تجویز شده (مترونیدازول و افلوکساسین) تا پنج روز بعد از بیوپسی باید همچنان طبق دستور قبلی (هر 8 ساعت) ادامه پیدا کند.
- خونریزی در داخل ادرار و یا مدفوع تا یک هفته بعد از انجام بیوپسی پروستات ممکن است ادامه پیدا کند و طبیعی است.
- در صورتی که خونریزی بیشتر از یک هفته ادامه پیدا کند و یا بیشتر شود به پزشک خود اطلاع دهید.
- دیده شدن خون در مایع منی (اسپرم) تا سه ماه بعد بعد از بیوپسی طبیعی است و جای نگران نمی باشد.
- بعد از انجام بیوپسی پروستات احتمال ایجاد عفونت پروستات وجود دارد. در صورت عفونت، تب و لرز رخ می دهد که امکان دارد همراه با سوزش ادرار نیز باشد در صورت وجود تب و لرز لازم است فوراً به بیمارستان مراجعه کنید.
- اورژانس بیمارستان تریتا به صورت شبانه روزی باز است و اگر بیمارستان دیگری در دسترس شما بود می توانید به آن بیمارستان هم مراجعه نمایید.
- در هنگام مراجعه به بیمارستان به پزشک اورژانس اطلاع دهید که بیوپسی پروستات انجام داده اید تا هرچه سریعتر اقدامات لازم برای درمان شما آغاز شود.
- در صورتیکه داروهای ضد انعقاد خون (مانند آسپرین و پلاویکس) مصرف میکردید و داروها را جهت انجام بیوپسی قطع کرده اید، بعد از یک هفته بیوپسی در صورتیکه که خون ریزی شما قطع شده بود میتوانید داروهای ضد انعقاد را مجدداً مصرف کنید. در صورتیکه خونریزی همچنان ادامه داشت مصرف داروی ضد انعقاد را مجدداً شروع نکنید و به پزشک خود اطلاع دهید.

بیمارستان تریتا

تهران، بزرگراه همت، بزرگراه شهید خرازی، بعد از تقاطع آزادگان، خروجی بیمارستان تریتا

0214۷۲۴۱۰۰0