

سي تي اسكن شك و لگن با تزريق

آمادگي هاي بيمار:

✓ بيمار بايد به مدت حداقل 4 ساعت ناشتا باشد.

✓ عدم سابقه حساسيت به داروي حاجب و حساسيت غذائي و فصلي

✓ داروي حاجب را با 1.5 ليتر آب مخلوط مي كنيم ، بيمار بايد هر 15 دقيقه يكبار

✓ يك ليوان از اين محلول بنوشد و بعد از نوشيدن آخرين ليوان بلافاصله **CT** اسكن انجام شود.

بیمارستان تریتا

تهران، بزرگراه همت ، بزرگراه شهید خرازی ، بعد از تقاطع آزادگان ، خروجی بیمارستان تریتا

0214۷۲۴۱۰۰۰

سي تي اسكن شك و لگن با تزريق

آمادگي هاي بيمار:

✓ بيمار بايد به مدت حداقل 4 ساعت ناشتا باشد.

✓ عدم سابقه حساسيت به داروي حاجب و حساسيت غذائي و فصلي

✓ داروي حاجب را با 1.5 ليتر آب مخلوط مي كنيم ، بيمار بايد هر 15 دقيقه يكبار

✓ يك ليوان از اين محلول بنوشد و بعد از نوشيدن آخرين ليوان بلافاصله **CT** اسكن انجام شود.

بیمارستان تریتا

تهران، بزرگراه همت ، بزرگراه شهید خرازی ، بعد از تقاطع آزادگان ، خروجی بیمارستان تریتا

0214۷۲۴۱۰۰۰

